



## Parvotest

Die Parvovirose ist eine hochansteckende und akut verlaufende Infektionskrankheit von Hunden (Canine Parvovirose), Katzen (Katzenseuche) und Marderartigen. Am auffälligsten sind Welpen im Alter von 2 – 16 Wochen. Die virale Erkrankung mit dem Parvovirus kann geimpft werden. Bei in der Schweiz erkrankten Tieren handelt es sich meistens um ungeimpfte Tiere oder Welpen aus Massenzuchten aus dem Ausland. Kardinalsymptome der Parvovirose sind akut auftretende (meist blutige) Durchfälle, Leukopenie und akute Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Trotz intensiver Therapie kommen auch Todesfälle vor.

Der Parvotest dient der Bestimmung des Erregers (Parvovirus) im Kot von erkrankten Hunden, Katzen und Marderartigen. Bei diesem Test handelt es sich um einen Schnelltest, bei welchem innert 10 Minuten ein Resultat ersichtlich ist. Da die Ausscheidung des Virus über die geschädigte Schleimhaut nur kurze Zeit (ca. 2 – 3 Tage) andauert, muss der Test bei einem betroffenen Tier nicht zwingend positiv ausfallen! Falsch positive Ergebnisse kommen jedoch auch bei Tieren vor, welche bis zu zwei Wochen vorher mit einem Lebendimpfstoff geimpft wurden.